

**საგვიანო ჯიშის მარწყვი „სალსა“  
ღია გრუნტზე**

	საკითხები	განმარტება
1	მოსავლის აღების დრო, სეზონი: დაწყება-დამთავრება	მოსავლის აღება წელიწადში ერთხელ. მწიფდება ივნისის ბოლო დეკადიდან ივლისის შუა რიცხვებამდე თანაბარი მწიფობით. მოსავლის აღება მოკლე დროში 25- 30 დღის განმავლობაში.
2	მოსავლის სახეობა- რამდენი ხარისხისაა (ГОСТ 6828-89)	მოსავლის აღება გადარჩევის მეთოდით: Iც ნაყოფის წონა ღია გრუნტის პირობებში საშუალოდ 25-35 გრ. (შესაძლებელია 50 გრ-მდეც იყოს) I-ლი ხარისხის - Ø 25 (და მეტი -Ø -საც) II- ხარისხის - Ø 18 მმ (და მეტი -Ø -საც) წუნდებული ნაყოფი, სანიტარულად და მიკრობიოლოგიურად დაზინძურებული ცალკე უნდა დალაგდეს.
3	შენახვის პირობები: დრო, საათი, დღე, t-°C	T-(0+20)°C - არა უმეტეს 3-4 დღე T(+20 ) °C -1 დღე-ღამე
4	მოსავლიანობა ღია გრუნტზე 1 მ <sup>2</sup> -ზე  1 ჰექტარზე მოსავლიანობა  მოსავლიანობა 1 ბუჩქზე  1მ <sup>2</sup> -ზე	3,0 კგ  30 ტონა - (30000 კგ)  1 კგ (100ც მარწყვი)  3-ბუჩქი
5	რამდენი მ <sup>2</sup> ფართობია საჭირო 1 ბუჩქისთვის: 1 ბუჩქისთვის საჭიროა	ა) 13ა-ზე-30000კგ:1,0კგ=30000 ბუჩქი 13ა-10000მ <sup>2</sup> -30000 ბუჩქი X-მ <sup>2</sup> =0,333მ <sup>2</sup> ფართობი- ( 1 ბუჩქისთვის)
6	მოსავლის აღება სეზონზე - დღე  ა)მოსავლის აღება 1 დღეში  ბ)მოსავლის აღება 1 დღეში	25-30 დღე ა)(25 დღეში)-30000კგ:25დღ=1200კგ. 1200კგ  ბ)30 დღეში)—30000კგ:30დღ=1000კგ. 1000კგ
7	ნაყოფის ბიოქიმიური შემადგენლობა : <ul style="list-style-type: none"><li>• კალორიულობა</li><li>• ცილები</li><li>• ცხიმები</li><li>• ნახშირწყლები</li><li>• ორგანული მჟავები</li><li>• საკვები ბოჭკო</li><li>• წყალი</li><li>• ნაცარი</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 41 კკალ</li><li>• 0,8 გრ</li><li>• 0,4 გრ</li><li>• 7,5გრ</li><li>• 1,3 გრ</li><li>• 2,2 გრ</li><li>• 87,4გრ</li><li>• 0,4 გრ</li></ul>
8	1ლ - 0,001 მ <sup>3</sup> ეტევა : ტყის - 0,400კგ	1მ <sup>3</sup> -ში ეტევა ტყის მარწყვი - 400 კგ

საგვიანო ჯიშის მარწყვი „სალსა“  
ღია გრუნტზე

შადის - 0,600 კგ	შადის მარწყვი - 600 კგ
------------------	------------------------