

**კლასიკური ჯიშის მარწყვი „სონატა“  
ღია გრუნტზე**

	საკითხები	განმარტება
1	მოსავლის აღების დრო, სეზონი: დაწყება-დამთავრება	მოსავლის აღება წელიწადში ერთხელ, მწიფდება ივნისის შუა რიცხვებში. მოსავლის აღება 40-45 დღის განმავლობაში. ივნისის შუა რიცხვებიდან აგვისტომდე.
2	მოსავლის სახეობა - რამდენი ხარისხისაა (ГОСТ 6828-89)	მოსავლის აღება გადარჩევის მეთოდით: 1ც ნაყოფის წონა ღია გრუნტის პირობებში 23-25 გრ. I-ლი ხარისხის- $\varnothing$ 25მმ. II-ხარისხის- $\varnothing$ 18 მმ წუნდებული ნაყოფი, სანიტარულად და მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებული ცალკე უნდა დალაგდეს.
3	შენახვის პირობებ: დრო, საათი, დღე t-°C	ოთახის t, 10-12 სთ, არა უმეტეს 24 სთ მაცივარში +(2 +6) °C 2-3 დღე (0+6) °C - 5 დღე
4	მოსავლიანობა ღია გრუნტზე - უხვმოსავლიანია	1 ჰა -ზე -102 ტონა 1მ <sup>2</sup> -ზე - 10,2 კგ
5	რამდენი მ <sup>2</sup> ფართობია საჭირო 1 ბუჩქისთვის  1 ბუჩქისთვის საჭიროა	1მ <sup>2</sup> -ზე 6 ბუჩქი - 10,2 კგ მარწყვი 1ჰა-ზე-60000 ბუჩქი მოსავლიანობა - ბუჩქზე -1,7 კგ 1მ <sup>2</sup> -ზე - 6 ბუჩქი X=0,166 მ <sup>2</sup> - 1 ბუჩქისთვის 0,166 მ <sup>2</sup> = 1660სმ <sup>2</sup>
6	მოსავლის აღება სეზონზე -დღე მოსავლის აღება - დღეში 1 ადამიანი 1 საათში კრეფს 23 კგ-ს. (რასაც აიოლებს, ის რომ ადვილად ცილდება ნაყოფი თავის ძირს)	45 დღე 102 000:45=2266კგ
7	ნაყოფის ბიოქიმიური შემადგენლობა: <ul style="list-style-type: none"> <li>• კალორიულობა</li> <li>• ცილები</li> <li>• ცხიმები</li> <li>• ნახშირწყლები</li> <li>• ორგანული მჟავები</li> <li>• საკვები ბოჭკო</li> <li>• წყალი</li> <li>• ნაცარი</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 41 კკალ</li> <li>• 0,8 გრ</li> <li>• 0,4 გრ</li> <li>• 7,5 გრ</li> <li>• 1,3 გრ</li> <li>• 2,2 გრ</li> <li>• 87,4 გრ</li> <li>• 0,4 გრ</li> </ul>
8	1ლ -0,001 მ <sup>3</sup> ეტევა: ტყის -0,400კგ ბალის- 0,600 კგ	1მ <sup>3</sup> -ში ეტევა ტყის მარწყვი- 400 კგ ბალის მარწყვი-600 კგ